

Apixaban

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Eliquis tbl flm

Substance:

Apixaban

Léková forma:

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou do žaludku je postupem on-label.
- Podání přípravku sondou za žaludek není možné!
→ Snížení biologické dostupnosti.

Alternativy:

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Terapeutická alternativa k podání sondou: Jiná perorální antikoagulancia – viz příslušná doporučení.
- Terapeutická alternativa k parenterálnímu podání: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin, fondaparinux.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Léčivo nelze podat sondou do duodena/jejuna!

Autor: Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D.

Aktualizace: 3. 12. 2019