

# Azitromycin (prášek pro suspenzi)

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Sumamed por plv sus

Sumamed Forte por plv sus

## **Substance:**

Azitromycin dihydrát

## **Léková forma:**

Prášek pro perorální suspenzi

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Připravte suspenzi dle návodu v příbalovém letáku.
2. Přerušete podávání výživy (při bolusovém režimu výživy časujte podání léčiva bezprostředně po podání bolusu, při cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva v průběhu či bezprostředně po ukončení cyklu).
3. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
4. Protřepejte dostatečně lahvičku s léčivem.
5. Odměřte požadovaný objem léčiva do sklenky, naředte převařenou vodou pokojové teploty v poměru 1:5, promíchejte.
6. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky a podejte do sondy.
7. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
8. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** PharmDr. Lenka Dundelová

**Aktualizace:** 5. 4. 2020