

Flukonazol

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Diflucan cps dur 100 mg

Flukonazol Sandoz cps dur 100 mg

Substance:

Flukonazol

Léková forma:

Tobolka, tvrdá, obsahující prášek, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

Podání přípravku sondou je postupem off-label!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Otevřete tobolku a vysypte její obsah do kádinky.
4. Přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty (množství vody úměrně navyšte v případě podávání dávky výrazně vyšší než 100 mg).
5. Krouživými pohyby promíchejte, suspenze vznikne během 1 min.
6. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
7. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
8. Poté přidejte do kádinky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
9. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
10. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Michela Šlesingerová, PharmDr. Alena Linhartová,
Mgr. Milena Čtveráčková

Aktualizace: 20. 3. 2021