

Ramipril

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Acesial tbl nob
Amprilan tbl nob
Medoram tbl nob
Piramil tbl nob
Ramil tbl nob
Ramipril Actavis tbl nob
Ramipril Aurovitas tbl nob
Tritace tbl nob

Substance:

Ramipril

Léková forma:

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Nelze vyloučit snížení účinku léčiva při podání sondou za žaludek – monitorujte klinickou účinnost léčiva!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Ramipril je léčivo s teratogenním potenciálem – těhotné ženy nebo ženy plánující těhotenství by proto neměly s ramiprilem manipulovat!
- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Tereza Cikánková

Aktualizace: 15. 9. 2020