

# Glimepirid

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Glimepirid Mylan tbl nob	Eglymad tbl nob
Glimepirid Sandoz tbl nob	Glymexan tbl nob
Glimepirid-Ratiopharm tbl nob	Oltar tbl nob
Amaryl tbl nob	

## **Substance:**

Glimepirid

## **Léková forma:**

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Při současném podání léčiva s výživou nelze vyloučit snížení absorpce a tedy i účinku léčiva.  
→ Zajistěte, aby bylo léčivo ve vztahu k výživě podáváno stále stejným způsobem (tj. stále s výživou nebo stále na lačno), tj. aby kolísání účinku léčiva bylo co nejnižší.  
→ Monitorujte glykémii.
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

## **Vhodnější alternativy:**

Inzulin

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU:**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy (při bolusovém či cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva na konec nejdélní denní pauzy v podávání výživy).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy (při bolusovém či cyklickém režimu výživy obnovte podávání výživy za 30 min po podání léčiva).

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** Mgr. Tereza Cikánková

**Aktualizace:** 12. 3. 2017