

# Oseltamivir

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Tamiflu cps dur

### **Substance:**

Oseltamivir fosfát

### **Léková forma:**

Tvrdá tobolka obsahující prášek, s okamžitým uvolňováním účinné látky

### **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Vhodnější alternativy:**

Nejsou k dispozici.

### **Další alternativy:**

- Suspenze: Komerčně vyráběný přípravek Tamiflu prášek pro perorální suspenzi (6 mg/ml) není v ČR k dispozici, suspenzi může připravit lékárník z přípravku Tamiflu tobolky, postup viz SPC přípravku.

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Otevřete tobolku a vysypte její obsah do kádinky.
4. Přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty.
5. Krouživými pohyby promíchejte, suspenze vznikne během 1 minuty.
6. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
7. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
8. Poté přidejte do kádinky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
9. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
10. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** Mgr. Helena Šťastná Koblihová

**Aktualizace:** 17. 3. 2017