

Rivaroxaban

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Xarelto tbl flm

Substance:

Rivaroxaban

Léková forma:

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou za žaludek není možné (snížení biologické dostupnosti)!
- Podání přípravku sondou do žaludku je postupem on-label. Po podání léčiva je nutno, aby okamžitě následovala enterální výživa.
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Vhodnější alternativy:

Parenterální antikoagulační: nízkomolekulární heparin, nefrakcionovaný heparin, fondaparinux.

Další alternativy:

Perorální antikoagulační: warfarin (off-label postup – viz příslušné doporučení).

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy (při bolusovém či cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva těsně před bolus či cyklus výživy).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Ihned obnovte podání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Nelze podat do duodena ani jejunu.

Autor: Mgr. Barbora Kováčová, PharmDr. Jaroslava Červeňová

Aktualizace: 10. 5. 2017