

Trazodon

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Trittico AC tbl ret

Trittico Prolong tbl pro

Substance:

Trazodon hydrochlorid

Léková forma:

Tableta, s prodlouženým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Rozdrcení tablety před podáním sondou je spojeno s porušením lékové formy, tj. s okamžitým uvolněním léčiva a tedy s rizikem výskytu nežádoucích účinků spojených s jeho vysokou koncentrací (zejm. hypotenze, sedace). Proto:
 - při dávkách > 100 mg/den je třeba upravit dávkování: celkovou denní dávku rozdělit do 2-3 dílčích dávek; lék podávat s výživou,
 - při dávkách ≤ 100 mg lze podat celkovou denní dávku najednou ve večerních hodinách (při výskytu nežádoucích účinků lze rovněž rozdělit celkovou denní dávku do 2-3 dílčích dávek; lék podávat s výživou).
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Vhodnější alternativy:

Nejsou k dispozici.

Další alternativy:

Terapeutické alternativy s jiným mechanismem účinku (v antidepressivní indikaci např. citalopram, venlafaxin).

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy (při bolusovém režimu výživy časujte podání léčiva bezprostředně po podání bolusu, při cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva v průběhu či bezprostředně po ukončení cyklu).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Michaela Navrátilová

Aktualizace: 2. 12. 2017