

Mesalazin

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Pentasa Sachet gra pro
Salofalk gra enp

Substance:

Mesalazin

Léková forma:

Pentasa Sachet gra pro:

Granule, s prodlouženým uvolňováním účinné látky (vázaným na granule)

Salofalk gra enp:

Granule, enterosolventní, s prodlouženým uvolňováním účinné látky (vázaným na granule)

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Přípravky lze podat sondou do žaludku, nejsou však vhodné pro podání sondou do duodena/jejuna!
→ Riziko změny terapeutického účinku při obchvatu místa zánětu.
→ Riziko okluze enterální sondy s užším vnitřním průměrem.
- Podat lze pouze intaktní granule – ověřte, že je přípravek podáván sondou s širším vnitřním průměrem (≥ 16 F)!
Nelze vyloučit okluzi sondy léčivem!

Alternativy:

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Mesalazin k perrektálnímu podání ve formě čípků: Asacol sup, Pentasa sup, Salofalk sup, Salozinal sup. Perrektální podání může být alternativou v případě distální lokalizace zánětu – léčivo ve formě čípku je distribuováno do oblasti rekta, event. esovitě kličky.
- Mesalazin k perrektálnímu podání ve formě klyzmatu: Asacol Enema rct sus, Pentasa rct sus, Salofalk rct sus. Perrektální podání může být alternativou v případě distální lokalizace zánětu – léčivo ve formě klyzmatu je distribuováno do oblasti rekta, esovitě kličky, event. sestupného tračniku.
- Terapeutická alternativa: Kortikoidy. Podání kortikoidů může být krátkodobou alternativou za účelem kompenzace onemocnění v případě problematického dosažení potřebného klinického účinku mesalazinu při podání sondou.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Zvláštní léková forma (granule se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby byl zachován charakter uvolňování léčiva a minimalizovalo se riziko okluze sondy!

Postup při podání sondou do žaludku (průměr ≥ 16 F):

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Otevřete sáček a podejte jeho obsah (neporušené granule) do sondy.
4. Propláchněte sondu 30 ml převařené vody pokojové teploty.
5. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Přípravky nejsou vhodné pro podání sondou do duodena/jejuna!

Autor: PharmDr. Šárka Erbanová, PharmDr. Alena Linhartová

Aktualizace: 1. 8. 2019