

# Mirtazapin (potahovaná tableta)

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Esprital tbl flm  
Mirtazapin Sandoz tbl flm  
Mirzaten tbl flm

## **Substance:**

Mirtazapin

## **Léková forma:**

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

## **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou je postupem off label!

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva a proplachy sondou do celkového denního příjmu tekutin!
- Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

**Autor:** Mgr. Michaela Navrátilová

**Aktualizace:** 5. 11. 2018