

Oseltamivir

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Tamiflu cps dur

Substance:

Oseltamivir fosfát

Léková forma:

Tvrdá tobolka obsahující prášek, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

Alternativy:

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Oseltamivir k podání sondou: Tamiflu por plv sus (oseltamivir ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze) – přípravek není v ČR k dispozici, suspenzi však může připravit lékárník z přípravku Tamiflu cps dur, postup viz SPC. Výhodou je možnost podávat jednotlivé dávky nižší než 75 mg.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Otevřete tobolku a vysypte její obsah do kádinky.
4. Přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty.
5. Krouživými pohyby promíchejte, suspenze vznikne během 1 min.
6. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
7. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
8. Poté přidejte do kádinky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
9. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
10. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Helena Šťastná Koblihová

Aktualizace: 16. 8. 2019