

Prasugrel

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Efient tbl flm

Substance:

Prasugrel hydrochlorid

Léková forma:

Tableta, potažená filmem, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Léčivo lze podat sondou do žaludku, není však vhodné pro podání sondou do duodena/jejuna!
→ Riziko snížení koncentrace a účinku léčiva při obchvatu kyselého prostředí žaludku.
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Vhodnější alternativy:

Nejsou k dispozici.

Další alternativy:

Kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, tikagrelor, viz příslušná doporučení.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Léčivo není vhodné pro podání sondou do duodena/jejuna!

Autor: Mgr. Helena Šťastná Koblihová, Kateřina Sadilová

Aktualizace: 8. 6. 2018