

# Rivaroxaban

## **Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:**

Xarelto tbl flm

### **Substance:**

Rivaroxaban

### **Léková forma:**

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

### **Upozornění pro lékaře:**

- Podání přípravku sondou do žaludku je postupem on-label.
- Podání přípravku sondou za žaludek není možné!  
→ Snížení biologické dostupnosti.

### **Alternativy:**

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Terapeutická alternativa k podání sondou: Jiná perorální antikoagulancia – viz příslušná doporučení.
- Terapeutická alternativa k parenterálnímu podání: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin, fondaparinux.

## **POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU**

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

### **Postup při podání sondou do žaludku:**

1. Přerušete podávání výživy (při bolusovém režimu výživy časujte podání léčiva bezprostředně před podání bolusu, při cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva bezprostředně před zahájení cyklu).
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Ihned obnovte podání výživy.

### **Postup při podání sondou do duodena/jejuna:**

1. Léčivo nelze podat sondou do duodena/jejuna!

**Autor:** Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D., PharmDr. Jaroslava Červeňová

**Aktualizace:** 7. 4. 2019