

Telmisartan

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Micardis tbl nob	Telmisartan Sandoz tbl nob
Telmark tbl flm	Tolura tbl nob
Telmisartan Egis tbl flm	Tezeo tbl nob
Telmisartan-Ratiopharm tbl nob	

Substance:

Telmisartan

Léková forma:

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Přípravky, které obsahují telmisartan ve formě potahovaných tablet: Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Milena Čtveráčková

Aktualizace: 22. 2. 2019